

Apresentações:

- 20 comprimidos | nº registo: 5443320

**MEDICAMENTO SUJEITO A RECEITA MÉDICA****FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR****Desloratadina toLife 5 mg comprimidos revestidos por película**

Desloratadina



78F02

Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o rereer.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

- 1.O que é Desloratadina toLife e para que é utilizado
- 2.Antes de tomar Desloratadina toLife
- 3.Como tomar Desloratadina toLife
- 4.Efeitos secundários possíveis
- 5.Como conservar Desloratadina toLife
- 6.Outras informações

1 O QUE É DESLORATADINA TOLIFE E PARA QUE É UTILIZADO

Desloratadina toLife é um medicamento antialérgico que não causa sonolência. Ajuda a controlar a reação alérgica e os respetivos sintomas.

Desloratadina toLife alivia os sintomas associados a rinite alérgica (inflamação das vias nasais causada por alergia, por exemplo, febre dos fenos ou alergia aos ácaros do pó). Estes sintomas incluem espirros, corrimento ou prurido nasal, comichão no palato e comichão, lacrimejo ou vermelhidão dos olhos.

Desloratadina toLife é também utilizado para aliviar os sintomas associados a urticária (uma alteração da pele causada por alergia). Estes sintomas incluem comichão e pápulas.

O alívio destes sintomas tem a duração de um dia inteiro e ajudá-lo-á a retomar as suas atividades diárias normais e o sono.

2 ANTES DE TOMAR DESLORATADINA TOLIFE**Não tome Desloratadina toLife**

- se tem alergia (hipersensibilidade) à desloratadina, a qualquer outro componente de Desloratadina toLife ou à loratadina.

Desloratadina toLife está indicado em adultos e adolescentes (a partir dos 12 anos de idade).

Tome especial cuidado com Desloratadina toLife

- se sofre de insuficiência renal
Por favor verifique com o seu médico antes de tomar Desloratadina toLife, se este caso se aplicar a si, ou se não tiver a certeza.

Ao tomar Desloratadina toLife com outros medicamentos

Não existem interações conhecidas de Desloratadina toLife com outros medicamentos.

Ao tomar Desloratadina toLife com alimentos e bebidas

Desloratadina toLife pode ser tomado com ou sem alimentos.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento durante a gravidez e aleitamento.

Se está grávida ou a amamentar, não é recomendado que tome Desloratadina toLife.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Na dose recomendada, não é previsível que Desloratadina toLife lhe provoque sonolência ou perturbe o seu estado de alerta. Contudo, muito raramente algumas pessoas poderão sentir sonolência, o que pode afetar a sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

3 COMO TOMAR DESLORATADINA TOLIFE

Adultos e adolescentes (a partir dos 12 anos de idade): tome um comprimido uma vez por dia. Engula o comprimido inteiro com água, com ou sem alimentos.

No que se refere à duração do tratamento, o seu médico irá determinar o tipo de rinite alérgica de que sofre e durante quanto tempo deverá tomar Desloratadina toLife. Se a sua rinite alérgica é intermitente (presença de sintomas durante menos de 4 dias por semana ou durante menos de 4 semanas), o seu médico irá recomendar-lhe um esquema de tratamento que dependerá da avaliação dos antecedentes da sua doença. Se a sua rinite alérgica é persistente (presença de sintomas durante 4 dias ou mais por semana e durante mais de 4 semanas), o seu médico poderá recomendar-lhe um tratamento prolongado. Para a urticária, a duração de tratamento pode ser variável de doente para doente e portanto deverá seguir as instruções do seu médico.

Se tomar mais Desloratadina toLife do que deveria

Só tome Desloratadina toLife de acordo com que lhe foi prescrito. Não são previsíveis problemas graves em caso de sobredose accidental. Todavia, se tomar uma dose de Desloratadina toLife superior à recomendada, contacte o seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar Desloratadina toLife

Caso se tenha esquecido de tomar a sua dose na hora apropriada, tome a dose de que se esqueceu logo que possível e retorne, seguidamente, ao seu esquema posológico regular. Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

4 EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Desloratadina toLife pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas. Nos adultos, os efeitos secundários foram aproximadamente os mesmos do que os observados com um comprimido de placebo. Contudo, fadiga, boca seca e dor de cabeça foram relatadas mais frequentemente do que com um comprimido de placebo. A dor de cabeça foi o efeito secundário mais notificado nos adolescentes.

Durante a comercialização de Desloratadina toLife, foram notificados muito raramente casos de reações alérgicas graves (dificuldade em respirar, respirar ruidosamente, comichão, urticária e inchaço) e exantema. Foram também notificados muito raramente casos de palpitações, batimento cardíaco rápido, dor de estômago, náusea (sentir enjoo), vômitos, mal-estar do estômago, diarreia, tonturas, sonolência incapacidade de dormir, dores musculares, alucinações, convulsões, agitação com aumento dos movimentos do corpo, inflamação do fígado e testes da função do fígado anormais.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5 COMO CONSERVAR DESLORATADINA TOLIFE

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 30°C.

Não utilize Desloratadina toLife após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no blister.

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Informe o seu farmacêutico caso detete qualquer alteração no aspeto dos comprimidos.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6 OUTRAS INFORMAÇÕES**Qual a composição de Desloratadina toLife**

- A substância ativa é desloratadina 5 mg.

- Os outros componentes são:

Núcleo do comprimido: Isomaltitol, Amido pré-gelificado, Celulose microcristalina, Óxido de magnésio pesado, Hidroxipropilcelulose, Crospovidona, Estearato de Magnésio.

Revestimento do comprimido: Álcool Polivinílico, Dióxido de Titânio (E171), Macrogol/PEG3350, Talco, Laca de alumínio de indigotina.

Qual o aspeto de Desloratadina toLife e conteúdo da embalagem

Os comprimidos biconvexos por película Desloratadina toLife 5 mg, são comprimidos revestidos por película azuis, biconvexos com um diâmetro de aproximadamente 6,5 mm.

Os comprimidos revestidos por película Desloratadina toLife 5 mg são acondicionado em blisters de policlorotrifluoretileno (PCTFE)/Cloro de Polivinilo (PVC) / Alumínio.

Os comprimidos revestidos por película Desloratadina toLife 5 mg são acondicionado em blisters de doses unitárias em embalagens de 7, 10, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 90 ou 100 comprimidos.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

toLife - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Avenida do Forte, 3 - Edifício Suécia IV, Piso 0

2794-093 Carnaxide

Fabricante

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara, 12351

Atenas – Grécia

Specifar S.A.

Este folheto foi aprovado pela última vez em agosto de 2014.

