

Apresentações:

- 14 comprimidos | n.º registo: 5023031
- 56 comprimidos | n.º registo: 5023056

**MEDICAMENTO SUJEITO A RECEITA MÉDICA****FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR****Ramipril + Hidroclorotiazida toLife 2,5 mg + 12,5 mg Comprimidos****Ramipril + Hidroclorotiazida toLife 5 mg + 25 mg Comprimidos****Ramipril + Hidroclorotiazida****Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.**

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

- O que é Ramipril + Hidroclorotiazida toLife e para que é utilizado
- Antes de tomar Ramipril + Hidroclorotiazida toLife
- Como tomar Ramipril + Hidroclorotiazida toLife
- Efeitos secundários possíveis
- Como conservar Ramipril + Hidroclorotiazida toLife
- Outras informações

1 | O QUE É RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA TOLIFE E PARA QUE É UTILIZADO

Ramipril + Hidroclorotiazida toLife é uma combinação de dois medicamentos chamados ramipril e hidroclorotiazida. O ramipril pertence a um grupo de medicamentos chamado "Inibidores da ECA" (Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina). Este medicamento atua:

- Promovendo a diminuição da produção pelo seu organismo de substâncias que aumentam a sua pressão sanguínea
- Promovendo o relaxamento e alargamento dos seus vasos sanguíneos
- Tornando mais fácil ao seu coração bombear o sangue para todo o corpo

A hidroclorotiazida pertence a um grupo de medicamentos chamado "diuréticos tiazídicos" ou comprimidos que promovem a eliminação de água. Este medicamento atua através do aumento da quantidade de água (urina) produzida por si. Este aumento produz uma diminuição da sua pressão sanguínea.

Ramipril + Hidroclorotiazida toLife é utilizado para tratar a pressão sanguínea elevada. As duas substâncias ativas funcionam em conjunto para baixar a sua pressão sanguínea. Estas duas substâncias são utilizadas em conjunto quando o tratamento com apenas uma delas não funcionou.

2 | ANTES DE TOMAR RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA TOLIFE**Não tome Ramipril + Hidroclorotiazida toLife:**

- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao ramipril, hidroclorotiazida ou a qualquer outro componente de Ramipril + Hidroclorotiazida toLife (ver secção 6)
- Se tem alergia (hipersensibilidade) a medicamentos similares a Ramipril + Hidroclorotiazida toLife (outros medicamentos inibidores da ECA ou derivados sulfonamídicos)
- Os sinais de uma reação alérgica podem incluir erupção cutânea, dificuldades em engolir ou respirar, inchaço dos seus lábios, face, garganta ou língua.

- Se tiver tido alguma vez uma reação alérgica grave chamada de "angioedema". Os sinais incluem comichão, sensação de picada (urticária), marcas vermelhas nas mãos, pés e garganta, inchaço da língua e garganta, inchaço ao redor dos olhos e lábios, dificuldade em respirar e engolir

- Se estiver a fazer diálise ou outro tipo de filtração sanguínea. Dependendo da máquina que está a ser utilizada Ramipril + Hidroclorotiazida toLife pode não ser adequado para si

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se tiver quantidades anormais de substâncias salinas (cálcio, potássio, sódio) no seu sangue

- Se tiver problemas de rins na zona em que o aporte de sangue ao seu rim está reduzido (estenose da artéria renal)

- Durante os últimos 6 meses de gravidez (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver quantidades elevadas de potássio no seu sangue (demonstrado nos resultados das análises ao sangue)

- Se tiver uma doença do colágeno vascular como por exemplo esclerodermia ou lúpus eritematoso sistémico

- Tem de informar o seu médico se pensa que está (ou pode vir a estar) grávida. A administração de Ramipril + Hidroclorotiazida toLife durante os 3 primeiros meses da gravidez não é recomendável e pode causar danos graves ao seu bebé após os 3 primeiros meses de gravidez (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)

- Se tiver problemas graves de fígado

- Se estiver a amamentar (ver a secção sobre "Gravidez e aleitamento" abaixo)